

70mm

70mm

40mm

40mm

200mm

200mm

### Herinneringskaart voor de patiënt bij gebruik van GOBIVAZ®

Deze herinneringskaart voor de patiënt bevat belangrijke veiligheidsinformatie waar u voorafgaand aan en tijdens de behandeling met GOBIVAZ van op de hoogte dient te zijn.

Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.

#### 1. Infecties

Het is mogelijk dat u tijdens uw behandeling met GOBIVAZ sneller een infectie oploopt. Het is mogelijk dat infecties zich sneller ontwikkelen en ernstiger zijn. Daarnaast is het mogelijk dat eerder doorgemaakte infecties terugkeren.

CMO code  
AW-MG-0000053 (v0.6)

#### 1.1 Voorafgaand aan de behandeling met GOBIVAZ:

- Vertel het aan uw arts als u een infectie heeft. U mag niet met GOBIVAZ worden behandeld als u lijdt aan tuberculose (tbc) of een andere ernstige infectie.
- U moet een tbc-screening ondergaan. Het is zeer belangrijk dat u het uw arts laat weten als u ooit tuberculose heeft gehad of direct contact heeft gehad met iemand die een

tuberculose-infectie heeft gehad. Vraag uw arts om hieronder aan te geven welke vorm(en) van tbc-screening het meest recent is/zijn uitgevoerd en wanneer dit/deze screeningsonderzoek(en) heeft/hebben plaatsgevonden.

Test \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Resultaat \_\_\_\_\_

Test \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Resultaat \_\_\_\_\_

- Vertel het aan uw arts als u weet of vermoedt dat u drager bent van het hepatitis B-virus.

#### 1.2 Tijdens en na de behandeling met GOBIVAZ:

- Schakel direct medische hulp in als u symptomen krijgt die een infectie doen vermoeden, zoals koorts, vermoeidheid, (aanhoudende) hoest, kortademigheid, griepachtige verschijnselen, gewichtsverlies, nachtzweeten, diarree, wonden, gebitsproblemen of een branderig gevoel bij het plassen.

#### 2. Zwangerschap en vaccinaties

Heeft u GOBIVAZ gekregen terwijl u zwanger was? Dan is het belangrijk dat u de arts van uw baby informeert voordat uw baby een vaccinatie krijgt. Uw baby mag geen 'levend vaccin' krijgen binnen 6 maanden na uw laatste GOBIVAZ-injectie tijdens de zwangerschap. Een voorbeeld hiervan is het vaccin dat tuberculose voorkomt (BCG).

#### 3. Data van GOBIVAZ-toediening

1e toediening: \_\_\_\_\_

Volgende toedieningen: \_\_\_\_\_

Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het partijnummer van uw geneesmiddel noteren.

#### 4. Overige informatie

Naam van patiënt: \_\_\_\_\_

Naam van arts: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer van arts: \_\_\_\_\_

- Zorg er ook voor dat u bij al uw bezoeken aan een zorgverlener een lijst meeneemt van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt.
- Draag deze kaart bij u tot 6 maanden na

toediening van de laatste dosis GOBIVAZ, want ook een tijd na uw laatste GOBIVAZ-dosis kunnen er nog bijwerkingen optreden.

- Lees de bijsluiter van GOBIVAZ zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

**ADVANSZ**  
PHARMA

AMS Component No.: **AW-MG-0000053 (v0.6)**

Product Description: **GOBIVAZ solution for injection in pre-filled Syringe**

Component: Medication Guide

Product Code: 106509 - 106510

Country: Belgium

Vendor Name: Alvotech Ltd.

**Proof Number:** **0.6**

Revision Date: 13-Oct-2025

Revised by: NRV

Dimension: 200 x 70 mm

Commodity No.: N/A

Pharma Code: N/A

Print Colours: Black

Non-Print Colours: **Cutter** & Spec box

Min. Font Size: 7.5 pt

**PAGE 1 OF 1**

Signature Page for AW-MG-0000053 v0.6

Task: IAR Regulatory Manager QC	Petrina Pearce 09-Dec-2025 14:03:57 GMT+0000
---------------------------------	---

Signature Page for AW-MG-0000053 v0.6