



Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel MYNZEPLI, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen / voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA-versie 03/2026).

Patiënteninformatiegids

MYNZEPLI[▼] (aflibercept 40mg/ml, oplossing voor injectie)

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

De informatie in deze brochure is niet bedoeld als vervanging van gesprekken tussen u en uw arts.

Deze brochure is bestemd voor patiënten die MYNZEPLI voorgeschreven hebben gekregen.



Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste drie maanden na de laatste injectie met MYNZEPLI.

MYNZEPLI mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, spreek dan met uw arts vóór uw behandeling met MYNZEPLI.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel MYNZEPLI gebruikt.
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek "Zoek informatie over een vergund geneesmiddel".

BE/AFL/NP/0012 | Maart 2026

Deze gids bevat belangrijke informatie over uw behandeling met MYNZEPLI (Aflibercept oplossing voor injectie), de injectieprocedure, symptomen waar u op moet letten en wanneer u contact moet opnemen met een arts.

U kunt de audioversie van deze gids beluisteren door de QR-code te scannen of door naar de website www.advanzpharma.com/product-risk-materials/aflibercept te surfen.



Uw oogkliniek is:

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

Adres: _____

E-mail: _____

Welkom bij uw informatie-brochure over MYNZEPLI

Uw arts heeft MYNZEPLI voorgeschreven omdat u een oogziekte heeft.

Deze gids helpt u om te begrijpen wat MYNZEPLI is en bevat belangrijke informatie over uw behandeling.

- Wie komt in aanmerking voor behandeling met MYNZEPLI
- Hoe kunt u zich voorbereiden op behandeling met MYNZEPLI
- Wat gebeurt er na de behandeling met MYNZEPLI
- Belangrijke tekenen en symptomen van bijwerkingen, inclusief ernstige ontsteking of infectie in het oog (endoftalmitis), ontsteking in het oog, verhoging van de druk in het oog, scheur in het pigmentepitheel, en vertroebeling van de lens (staar)
- Wanneer moet u met spoed contact opnemen met een arts
- Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken en zwangere vrouwen mogen niet behandeld worden met MYNZEPLI

Vóór u met uw behandeling begint, lees aandachtig deze informatie en de bijsluiter van dit geneesmiddel die u op de website van het FAGG kunt raadplegen: www.fagg.be -> Zoek informatie over een vergund geneesmiddel.

Een exemplaar van de bijsluiter van dit geneesmiddel is eveneens beschikbaar aan het eind van deze gids.

Inhoud

Waarom is MYNZEPLI aan u voorgeschreven?	7
Enkele definities	8
Wat is natte LMD?	9
Wat is RVO, CRVO en BRVO?	9
Wat is DMO?	10
Wat is mCNV?	11
Wat is MYNZEPLI?	12
Wat moet ik aan mijn arts vertellen voordat ik aan de behandeling met MYNZEPLI begin?	14
Hoe kan ik mij voorbereiden op mijn afspraak over MYNZEPLI?	15
Wat gebeurt er tijdens mijn afspraak over MYNZEPLI?	16
Wat moet u doen als u vragen heeft over MYNZEPLI?	17
Wat kan ik verwachten na mijn afspraak over MYNZEPLI?	18
Wat zijn de bijwerkingen van MYNZEPLI?	20
Wanneer moet u met spoed een zorgverlener contacteren?	22
Wanneer moet u voor een nieuwe afspraak terugkomen?	23

Waarom is MYNZEPLI aan u voorgeschreven?

Uw arts heeft MYNZEPLI voorgeschreven omdat u één van de volgende oogziektes heeft:

- de neovasculaire (natte) vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD)
- verminderd zicht door macula-oedeem als gevolg van retinale veneuze stamocclusie (Central Retinal Venous Occlusion, CRVO) of retinale veneuze takocclusie (Branch Retinal Venous Occlusion, BRVO)
- verminderd zicht als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DMO)
- verminderd zicht als gevolg van myope choroïdale neovascularisatie (mCNV)

Deze ziekten hebben allemaal te maken met het netvlies.

Enkele definities:

- Het **netvlies** bevindt zich achter in het oog en vangt alle beelden op die we zien, zoals een film in een camera.
- De **macula** is het centrale deel van het netvlies dat in staat stelt om details van objecten voor u duidelijk te zien, zoals gezichten en woorden in boeken.
- **VEGF** is een vasculair endotheliale groeifactor die van nature voorkomt in het lichaam en betrokken is bij de groei van bloedvaten. Te veel VEGF in het netvlies kan leiden tot de groei van abnormale, lekkende bloedvaten. Dit kan ervoor zorgen dat het netvlies gaat zwellen, wat tot een verlies van het centrale zicht leidt, maar er bestaan behandelingen die dit kunnen helpen vertragen.

Wat is natte LMD?

Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD) is een oogziekte die het netvlies en in het bijzonder de macula treft. Deze treedt op als er nieuwe abnormale en lekkende bloedvaten onder het netvlies groeien.

Wat is RVO?

RVO is een aandoening van het netvlies die gekenmerkt wordt door de **blokkade van een ader in het netvlies**, wat resulteert in een vertraging of een blokkade van de bloeddoorloop in het netvlies.

Met het ouder worden verandert de flexibiliteit van de bloedvaten, en kunnen ze makkelijker verstopt raken. De vorming van een bloedstolsel resulteert in de opstapeling van bloed in het netvlies, die VEGF vrijgeeft om bloedvaten aan te maken en die een neovasculair glaucoom kan veroorzaken.

Er bestaan twee soorten RVO, afhankelijk van waar de blokkade zich bevindt: CRVO en BRVO.

Wat is CRVO?

Retinale veneuze stamocclusie (Central Retinal Venous Occlusion, CRVO) is een aandoening die een blokkade veroorzaakt van de hoofdader van het netvlies die het bloed uit het netvlies leidt.

Wat is BRVO?

Retinale veneuze takocclusie (Branch Retinal Venous Occlusion, BRVO) is een aandoening die een blokkade veroorzaakt van één of meer takken van de hoofdader van het netvlies die het bloed uit het netvlies leidt.

Wat is DMO?

Diabetisch macula-oedeem (DMO) is een oogziekte die optreedt wanneer vocht zich ophoopt in het netvlies en die een zwelling van het netvlies veroorzaakt.

Wat is mCNV?

Bij mensen met hoge myopie (bijziendheid) wordt de oogbol groter of langer, waardoor het netvlies kan uitrekken en dunner kan worden. Deze uitrekking of verdunning kan de groei van nieuwe bloedvaten veroorzaken vanuit een laag die zich achter het netvlies bevindt, het "vaatvlies", en voor de bloedtoevoer naar het oog zorgt. Dit heet myope choroïdale neovascularisatie (mCNV), waarbij de groei van bloedvaten gestimuleerd wordt door VEGF. Deze bloedvaten kunnen voor het lekken van bloedpartikels in het oog zorgen.

Wat is MYNZEPLI?

MYNZEPLI is bestemd voor volwassenen die de diagnose natte LMD, DMO, CRVO, BRVO of mCNV hebben gekregen.

MYNZEPLI behoort tot de groep geneesmiddelen die anti-VEGF genoemd worden. Het blokkeert de activiteit van een groep factoren die vasculair endotheliale groeifactor van het type A (VEGF-A) en placentaire groeifactor (PGIF) genoemd worden.

Bij natte LMD, CRVO, BRVO, DMO en mCNV zijn deze factoren in overvloed aanwezig.

Door deze factoren te blokkeren, kan MYNZEPLI helpen om uw zicht te stabiliseren en in veel gevallen te verbeteren.

MYNZEPLI is een vloeibare oplossing die in het oog wordt geïnjecteerd:

MYNZEPLI 40 mg/ml, komt overeen met een geïnjecteerde dosis van 2 mg.

Als u lijdt aan natte LMD, DMO, CRVO, BRVO of mCNV, kan uw arts u MYNZEPLI 40 mg/ml toedienen, wat overeenkomt met een geïnjecteerde dosis van 2 mg MYNZEPLI.

Uw arts zal u een behandelplan voorstellen. Het is zeer belangrijk dat u dit respecteert. Contacteer uw arts of uw verpleegkundige als u vragen of twijfels over MYNZEPLI heeft.

Wat moet ik aan mijn arts vertellen voordat ik aan de behandeling met MYNZEPLI begin?

Voordat uw behandeling met MYNZEPLI begint, moet u het uw arts of verpleegkundige vertellen als:

- U een infectie heeft in of rondom uw oog;
- Uw oog momenteel rood is of pijn doet;
- U denkt dat u mogelijk allergisch (overgevoelig) bent voor aflibercept of voor een van de bestanddelen van MYNZEPLI, voor jodium of voor pijnstillers. De volledige lijst van bestanddelen kunt u vinden in de bijgevoegde bijsluiters.
- U problemen heeft gehad met eerdere ooginjecties;
- U glaucoom of een voorgeschiedenis van verhoogde oogdruk heeft;
- U lichtflitsen of zwevende zwarte vlekjes ziet of heeft gezien;
- U medicijnen gebruikt, met of zonder voorschrift;

- U binnen 4 weken voorafgaand aan de behandeling met MYNZEPLI een oogoperatie heeft gehad of binnen 4 weken na de behandeling met MYNZEPLI een oogoperatie krijgt;
- U zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. **MYNZEPLI mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.** Bespreek dit met uw arts voordat u aan een behandeling met MYNZEPLI begint. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten **effectieve anticonceptie gebruiken tijdens hun behandeling met MYNZEPLI en gedurende ten minste 3 maanden** na de laatste injectie met MYNZEPLI.
Het gebruik van MYNZEPLI wordt niet aanbevolen tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Hoe kan ik mij voorbereiden op mijn afspraak over MYNZEPLI?

Om u op uw afspraak voor te bereiden:

- Na uw behandeling kan het zijn dat u wazig ziet. Daarom mag u niet zelf naar huis rijden. U kunt een vriend of familielid vragen om u naar uw afspraak te brengen of u kunt iets anders regelen om naar uw afspraak te gaan en terug naar huis te gaan.
- Draag geen make-up op de dag van uw afspraak.

Wat gebeurt er tijdens mijn afspraak over MYNZEPLI?

Uw arts heeft ervaring in het geven van ooginjecties. Tijdens uw afspraak zal de arts:

- U moet een overhemd en een beschermende kap dragen,
- Uw oog schoonmaken om infecties te voorkomen,
- Een verdovend medicijn op uw oog doen, zodat u minder pijn heeft. Dit kan helpen om het comfortabeler voor u te maken tijdens de injectie,
- Uw oog en het gebied eromheen zullen zorgvuldig schoon gemaakt worden,
- Een speciale doek zal uw gezicht bedekken,
- Uw oog zal open gehouden worden zodat u niet knippert,
- Het oogbad vertroebelt het zicht zodat u de naald niet ziet.

Een ervaren arts voert daarna de injectie in het wit van uw oog uit.

U kan een lichte druk voelen op het moment van de injectie.

Wat moet u doen als u vragen heeft over MYNZEPLI?

Als u twijfels of vragen heeft, kunnen uw arts en/of uw verpleegkundige u antwoorden en u geruststellen.

Zij zijn ervaren en kennen uw gezondheidstoestand.

Aarzel niet om hen vragen te stellen.

Wat kan ik verwachten na mijn afspraak over MYNZEPLI?

- Misschien doet uw arts **een paar oogtesten** na uw MYNZEPLI-injectie. Dat kan onder andere een test zijn om de oogdruk te meten.
- Het kan zijn dat u na uw injectie **wazig ziet**. Zolang dit duurt, mag u niet autorijden.
- Als u contactlenzen gebruikt, kan uw arts of verpleegkundige u adviseren wanneer u die weer kunt gebruiken.

Het kan zijn dat u **een bloeddoorlopen oog** heeft in de eerste paar dagen na de injectie of dat u **bewegende vlekjes** ziet. Beide symptomen moeten binnen een paar dagen verdwijnen. **Als dat niet gebeurt, of als ze erger worden, moet u contact opnemen met uw arts.**

Sommige mensen voelen **wat pijn of ongemak** in hun oog na de injectie. **Als de pijn niet weggaat of erger wordt, moet u contact opnemen met uw arts.**

Uw arts zal u een lijst met nummers geven die u in geval van nood kan contacteren.

Zorg ervoor dat een familielid of iemand anders u naar huis kan brengen.

Wat zijn de bijwerkingen van MYNZEPLI?

Zoals elk medicijn, kan MYNZEPLI bijwerkingen veroorzaken. Niet iedereen die een MYNZEPLI-injectie krijgt, ervaart bijwerkingen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u een of meer van de bijwerkingen uit onderstaande tabel krijgt. Deze kunnen namelijk duiden op een ernstige complicatie van de behandeling.

Aandoening	Mogelijke tekenen of symptomen
Infectie of ontsteking in het oog	Oogpijn of meer ongemak Verergerde roodheid van het oog Gevoeligheid voor licht Zwelling van het ooglid Veranderingen in het zicht, zoals plotseling minder zicht of wazig zien
Vertroebeling van de lens (cataract)	Wazig zien Schaduw zien Minder scherpe lijnen en vormen Veranderingen in het zien van kleuren (kleuren lijken bijv. verbleekt)
Toename van de oogdruk	Kringen zien rondom lichtbronnen Oogpijn Bloeddoorlopen oog Misselijkheid of overgeven Veranderingen in het zicht

Aandoening	Mogelijke tekenen of symptomen
Loslating of scheur van een laag van het netvlies	Plotselinge lichtflitsen Plotseling optreden of toename van bewegende vlekjes Een 'gordijn' over een gedeelte van het gezichtsveld Veranderingen in het zicht
Allergische reacties (overgevoeligheid)	Huiduitslag Jeuk (pruritus) Huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos) Zwelling van het gezicht Algemene zwelling Ademhalingsmoeilijkheden Gevoel van onwelzijn (anafylactische / anafylactoïde reactie) Deze reacties kunnen ernstig zijn en vereisen dat u onmiddellijk uw arts contacteert

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, www.fagg.be, afdeling Vigilantie, website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg-afmps.be.

U kunt bijwerkingen ook melden aan de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Advanz Pharma op het telefoonnummer 0800 78 941 of per e-mail naar medicalinformation@advanzpharma.com. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Kijk voor de volledige lijst van bijwerkingen in de bijsluiter van MYNZEPLI die u op de website van het FAGG kunt raadplegen: www.fagg.be -> Zoek informatie over een vergund geneesmiddel.

Wanneer moet u met spoed een zorgverlener contacteren?

CONTACTEER ONMIDDELIJK en CONSULTEER met SPOED uw oogarts of de spoeddienst. Uw arts zal u een lijst met nummers geven die u in geval van nood kan contacteren.

Op eender welk moment, wanneer u één of meerdere van de volgende tekenen of symptomen ondervindt:

- Roodheid van het oog
- Verminderd, wazig of vervormd zicht
- Verhoogde gevoeligheid voor licht
- Oogpijn
- Abnormale waarnemingen zoals cirkels rond lichtbronnen, lichtflitsen, zwevende deeltjes, vermindering van het gezichtsveld
- Gevoel van vreemde deeltjes in de ogen
- Verhoogde traanproductie
- Irritatie of zwelling van het ooglid
- Pijn of irritatie op de plaats van de injectie
- Bindvlies- of oogontsteking

of als u tekenen van een allergische reactie ontwikkelt:

- Zwelling van het gezicht en/of algemene zwelling, algemene huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid...

Wanneer moet u voor een nieuwe afspraak terugkomen?

Uw arts zal samen met u uw volgende afspraak plannen. Hij zal een behandelingschema bepalen dat het best aan uw noden en aan uw situatie aangepast is.

Uw arts en/of uw verpleegkundige zijn het best geplaatst om met u over de planning van uw behandeling te spreken.

Contacteer uw arts vooraleer u beslist om met uw behandeling te stoppen.

Deze brochure is ook als digitale versie en als audiogids beschikbaar. De audiogids is een luisterversie van de tekst in deze brochure. Gebruik het foto toestel van een smartphone om de QR-code hieronder te scannen om de audiogids te raadplegen.

Voor een digitale versie van deze brochure kunt u deze QR-code scannen:



Voor de audiogids kunt u deze QR-code scannen: of ga naar de website www.advanzpharma.com/product-risk-materials/aflibercept



Meer informatie vindt u in de bijsluiter. Scan de QR-code hieronder voor de bijsluiter:



ADVANZ PHARMA

Telefoon: 0800 78 941

E-mail : medicalinformation@advanzpharma.com

BE/AFL/NP/0012 | Maart 2026